宁夏启动关爱自闭症儿童公益守护计划

益行动联合会,共同开展以"融合在行动 有爱不孤单"为

主题的系列活动,2021年宁夏公益关爱自闭症儿童守护

儿童在家长的陪伴下体验着由爱心机构和公益志愿者们准 备的平衡车、尤克里里、给大树穿上花衣裳等活动。现场,

方香心理咨询师事务所心理咨询师魏娜还为孤独症儿童家

长开展了心理讲座,为家长解答如何面对压力以及缓解焦 虑情绪,用更积极的心态面对生活中的艰辛和考验。

下两部分组成。线上将通过@宁夏公益微信公众平台,开

启"星空树洞",孤独症家庭扫描二维码,可以在线留言,

"星空树洞"会对留言进行回复,并对接社会资源一同为

"星星的家庭"提供帮助。线下开启"百店守护行动",由

来自@宁夏公益的志愿者们对接100个优质商户,他们将

为孤独症患者提供技能学习、生存能力实践的机会。截至

目前,全区各级残联已累计支持28家残疾儿童定点康复

机构开展自闭症儿童康复训练工作,每年累计为300余名

台,真正贴近孤独症群体,提升孤独症儿童服务质量,号

召更多社会爱心人士、企业和组织关注、关心、关爱孤独

症人士及其家庭。"宁夏残疾人康复中心启智科业务主管

"通过举办活动整合社会各方资源,搭建融合交流平

自闭症儿童提供各项康复救助训练。

本报讯(记者 王 茜) 4月2日是第十四届世界自闭 症宣传日,宁夏残疾人康复中心联合宁夏公益网、银川公

当日,在宁夏残疾人康复中心三楼大厅,50名自闭症

据悉,宁夏公益关爱自闭症儿童守护计划由线上线

# 药品开封后有效期不一定还有效

感冒药、肠胃药、解热镇痛药、慢性病药……现在很多家庭都备着各种常用 药。家庭小药箱的普遍存在,一方面体现了人们健康意识的提高,另一方面也带来 了过期药品的问题。药不是食物,没有为了不浪费而无病吃药的道理。今天,我们来 给大家说一说药品有效期究竟如何计算,有效期是否等同于使用期,以及过期药的危害。



### "哪一天"过期怎么算

药品有效期是指药品在规定的贮存 条件下,质量及药效能够符合规定要求 的时限,也是供临床使用的最长有效期 限(天数、月数或年数)。

药品有效期是在对该药品进行一整 套科学试验的基础上制定的。通过查看 药品外包装(如药瓶、药盒等)或内包装 (如胶囊铝箔、输液袋等),可以看到药品 生产日期、有效期的标注,部分药品还标 注了失效日期。

根据现行《药品说明书与标签管理 规定》,药品有效期应当按照年、月、日的 顺序标注,年份用四位数字表示,月、日 用两位数字表示。其具体标注格式为 "有效期至xxxx年xx月"或"有效期 至xxxx年xx月xx日",也可用数字和其 他符号标示为"有效期至××××.××."或"有 效期至xxxx/xx/xx"等。

但是,并非所有人都会正确计算药 品的具体失效时间。看看下面的正确示 例就明白了。

如果药品"有效期"为2022年1月, 就是说药品至2022年1月31日还有效, 即有效期是指当月而言。如果药品"失 效期"为2022年1月,则表示药品可以使 用到2021年12月31日,即药品在标注月 份的第一天就已失效。

再说得具体些:

有效期为2年的药品,若标注的生 产日期为 2020/9/21,则该药品可用至 2022年9月20日:

药品标注"有效期:2021年11月30 日"或"有效期:2021年11月",都只能使 用到 2021 年 11 月 30 日:

药品标注"失效期:2021年10月30 日",只能使用到2021年10月29日;

药品标注"失效期:2021年10月", 只能使用到2021年9月30日。

## 药品开封后 可以用多久

药品在开封后,包装上标注的有效 期只能作为一个参考值,不同剂型药物 的实际可用期限有所不同。

已开封的特殊剂型药品:如滴眼液 最多用4周。

中华人民共和国药典(2015年版)有 明确规定:多剂量的眼用制剂(眼膏、滴 眼液等)、鼻用制剂、耳用制剂、涂剂、涂 膜剂等在启用后最多可使用4周。若说 明书中另外注明药品开封后的使用期 限,则以药品说明书为准。一旦药品性 状发生变化,出现絮状、沉淀等,无论何 时均不能再使用。

已开封的其他药品:如瓶装胶囊不

除说明书另有规定外,一般建议如下: ◆**重新包装的药品** 指将药品从原 包装中移出并置于另一个包装(通常是 一个更小的包装)中,常见于住院患者每 日摆药的药品。对于重新包装于单剂量 容器的药品,其有效期自重新包装之日 起不应超过6个月,或不应超过药品剩余 有效期的25%,二者以较早的期限为准。

◆瓶装片剂和胶囊剂 可参照以上 重新包装药品使用期限的规定,即开启 后不超过6个月或药品剩余有效期的 25%,以较早的时间为准。

◆糖浆剂 止咳糖浆等糖浆剂由于含 蔗糖量较高,开封后不建议长期保存。开 封后的保存时限为室温1个月至3个月,一 般冬天不超过3个月,夏天不超过1个月。

◆中药煎剂 中药煎剂分为医院代 煎和家中自煎两种情况,前者为密封袋 保存,一般冰箱冷藏保存7-14天,室温3 天,但因不同方剂成分存在差异,建议以 各医院药房的要求为准;家中自煎中药 无密封条件,建议当日服用完毕。

◆生物制品 胰岛素类药品、鲑降钙 素鼻喷剂等生物制品,未开封时置于 2摄氏度至8摄氏度避光保存,开封后常 温避光保存,最多可使用4周。

## 这些过期药 千万不要吃

我们不建议服用过期药品,尤其 是下面几种药品,超出有效期后会对 人体健康造成危害,甚至有致命风险。

抗菌药物 过期青霉素、头孢类 药物易产生一系列有害物质导致过 敏性反应,甚至过敏性休克;四环素 类药物过期后,会分解出毒性较大的 物质,引起恶心、呕吐,以及酸中毒。

急救药 所谓急救,就不能有半 点侥幸心理,药效更不能打折扣。比 如,用于心绞痛急救的硝酸甘油一旦 过期失效,服用后不能缓解心肌缺血 的情况,危害是致命的。

非甾体抗炎药 如阿司匹林,过期 后易分解为水杨酸,不仅没有药效,反 而会增加胃肠道刺激等不良反应。

口服液 口服液长期静置极易产 生沉淀,一方面影响药品均一性,使 剂量无法估算,疗效难以确认;另一 方面,产生的有害物质会危害健康。

儿童常用药 儿童用药一般会添 加糖分使儿童易于入口。但因为含 糖,此类药物易滋生细菌等微生物导 致药品腐败霉变,因此应特别注意过 期后不能再给孩子服用。

如果不小心误服过期药品,建议 大量饮水,加速药物排泄。同时密切 观察是否出现身体不适,如皮肤瘙 痒、皮疹、恶心、呕吐等症状,并记录 服用药品的名称及药品超过有效期 的时间。若症状加重,需尽快至附近 医疗机构就诊

另外,试图通过加大服用过期药 品的药量以达到疗效的做法,是绝对 不可取的,因为加大剂量就相当于增 加毒副作用。

最后提醒大家,在有效期内使用 药品是保证用药安全的基本前提,同 时需按照药品包装和说明书上的药 品贮存条件保存药品,药品开封后的 实际使用期限参考前文所述。

## 全区首台达芬奇手术机器人"上岗"

本报讯(记者 陈治学) 近日,宁夏医科大学总医院 举行达芬奇手术机器人开机暨宁夏医科大学总医院机器 人微创手术中心成立挂牌仪式,宁夏首台达芬奇手术机器 人在该院手术室正式"上岗"。

"作为目前世界上最先进的微创外科手术系统,达 芬奇手术机器人系统打破了传统手术的局限,给微创手 术带来了革命性变革。达芬奇手术机器人的引进,使宁 夏地区外科手术从此迈入了超精准微创时代,标志着宁 夏医科大学总医院实现与国际一流诊治水平的精准接 轨,这成为宁夏及周边地区患者家门口即可享受国际标 准治疗的重要保障。"宁夏医科大学总医院院长金群华 说,机器人微创中心的挂牌成立,是医院高质量、内涵建 设发展的需要,也是医院学科建设发展的需要。随着该 系统在普外、泌尿、妇产、胸外等各学科领域的大规模应 用,必将进一步推动各学科的精准化进程。该中心将成 为优质诊疗的重要辐射点,带动宁夏及周边地区更多医 生了解机器人相关信息,进而推动区域内微创外科治疗 医护理念与水平的同步发展作出贡献,最终回到实现患

随后,该院泌尿外科赵瑞宁教授团队进行了达芬奇 手术机器人首台手术,成功为一名巨大肾肿瘤的患者完成 了微创手术。

## 我区开展未成年人 先天性心脏病救治行动

本报讯(记者 王 茜) 4月6日,记者获悉,自治区卫 生健康委联合自治区扶贫办、医保局、红十字会、第20批 赴宁博士服务团、北京阜外医院、301 医院等单位印发《宁 夏同族自治区未成年人先天性心脏病医疗教治工作方 案》,在我区开展未成年人先天性心脏病免费筛查救治公

据了解,本次先天性心脏病救治行动得到了第20批 赴宁博士服务团的全力支持,博士服务团心系宁夏,积极 主动与中国人民解放军总医院(301 医院)联系,组织优质 医疗团队和相关基金会与卫生健康委对接,帮助宁夏推进 儿童先天性心脏病免费筛查救治公益行动。经301医院 专家团队和自治区医疗机构筛查和确诊,全区有87名患 儿急需手术治疗,其中有60名复杂危重先心病患儿需前 往301 医院接受治疗,17 名患儿可在自治区定点医疗机构 接受治疗。为确保患儿能得到便捷、安全、高效的医疗救 治,细致入微卫生健康委积极与301医院、博士服务团对 接,协调患儿前往301医院接受治疗,301医院和博士团协 调相关基金会对患儿救治费用和交通、住宿费用进行救 助,极大地减轻了患儿家庭的负担。截至3月15日,已组 织患儿分3批次32人入住301医院,其中农村建档立卡 户、低保户患儿13人,边缘户患儿14人,一般家庭患儿5 人,已顺利完成手术治疗24人,待手术治疗8人。组织区 内定点医疗机构完成手术治疗6人,待手术治疗11人。

先心病救治行动的开展,减少了先天性心脏病对儿 童的身心伤害,挽救了患儿的生命,保障了患儿的健康成 长,也减轻了患儿家庭的负担,使患儿得到了新生,有力 推动了我区的健康扶贫工作。

## 银川市第一人民医院 健康助力行活动走进宁东

本报讯(记者 单 瑞)为进一步落实国家"健康中 国"政策,按照"健康宁夏"统一部署。近日,银川市第一 人民医院院长马瑞霞带领核心专家团队前往宁东医院开 展健康助力行活动,为宁东地区广大群众提供优质的医疗

在宁东医院,双方互相介绍了医疗资源现状、优势、 医院定位、发展前景等情况,并签署合作协议书。随后, 专家团队参观了宁东医院,各临床科室之间进行了点对点 交流,通过疑难病例讨论、查房会诊、座谈交流等形式明 确深化合作目标、拓宽合作方式。

今后,银川市第一人民医院与宁东医院将通过党建 合作、人才培养、技术支持、"互联网+医疗健康"、预约诊 疗、科研协作等不同的形式相互学习、取长补短,提升医 疗服务水平,落实上下联动、分级诊疗等医改政策,促进 医院综合实力共同提高,努力推动宁夏医疗服务向品牌 化、规范化、区域化方向发展。



### 家庭小药箱需定期整理

家庭小药箱如果频繁出现过期药,主要原因还是囤得太多。 首先建议大家平时不要大量囤积药品,一旦疏于整理, 就会存在误服过期药品的隐患。

其次,养成定期整理的习惯,可每3个月整理一次,将不同有 效期的药品按照药品说明书写明的贮存条件分类存放。发现过期 药品,切记不要再服用,按照有害垃圾处理,以保证用药安全。

(据《北京日报》)

扁桃体炎反复发作 到底要不要忍痛割爱? 专家介绍——

吃过期食物有可能拉肚子,吃

药品过期后,随着时间的增加

疗效会降低,甚至失效,达不到理想

的治疗效果可能导致疾病加重。另

外,由于药品已发生理化性质的改

变、发霉或变质,还会产生有害物

质。需要说明的是,不要觉得药品

外观、气味无明显变化,刚刚过期就

没事。因为一些冲剂、糖浆等加入

辅料的药品容易在一定温度下发生

霉变,滋生细菌,而肉眼很难察觉。

因此,药品一旦过期,为了保证疗效

期的药品也不一定安全。人们往往

会忽略一件事: 药品外包装上的有

效期是在药品按规定条件下贮存并

年版)规定,不同药品的贮存条件是

不同的。药品的贮存主要受温度、湿

度、光照、空气等条件影响。一般来

说,药品的保存湿度适宜范围在

45%-75%,常温储存药品的温度要求

在10摄氏度至30摄氏度之间。部分

药品易受温度和光照的影响,需要放

置于阴凉处、凉暗处或者冷藏保存。

其中,"阴凉"指温度不超过20摄氏

度,"凉暗"指避光保存且温度不超过

20摄氏度,"冷藏"温度应在2摄氏度

至10摄氏度之间。此外,"避光"是

指避免日光直射;"密闭"指将容器密

闭,以防止尘土及异物进入;"密封'

指将容器密封以防止风化、吸潮、挥

温度、光照、湿度等)反复接触,发生

物理化学改变及被污染的风险随之

加大,尤其是滴眼剂或糖浆剂等制

剂。所以,在药品开封后,包装上标

注的有效期并不能绝对保证药效,

也就不完全等同于实际使用期。

当药品开封后,与外界环境(如

在一些情况下,没有超过保质

根据中华人民共和国药典(2015

及用药安全,应立刻停止使用。

未开封的有效期。

发或异物进入。

过期药的后果可没这么简单。

## 这五种情况 扁桃体还是别留了

慢性扁桃体炎是一种常见疾病,相信很多人都在经历。据调查,人群中存在慢性扁桃体炎的患者约为 22%, 儿童中发病率更高。一想到扁桃体有帮助身体对抗感染的作用, 有些人即使长期遭受慢性炎症困扰, 也不 愿切除扁桃体,这样真的好吗?医生建议,出现五种情况,可以考虑把扁桃体切除。

### 扁桃体炎可累及全身

扁桃体,又称扁桃腺,因为外形像扁桃一 样而得名。一般所说的扁桃腺是指肉眼可见 的颚扁桃体。其位于咽峡的侧壁,舌腭弓和咽 腭弓之间,呈扁卵圆形,表面盖着黏膜上皮,底 面包着纤维被膜,与咽壁的肌层联系很松,容 易分离;另外还有咽扁桃体和舌扁桃体。



与其他的腺体组织 一样,扁桃腺是人体免疫 系统的一部分,是咽淋巴组织中体积最大 者,属于咽部淋巴内环中的一分子。在儿童 6至7岁时淋巴组织增生,扁桃体可能会变 得肥大,这属于生理性肥大,到中年以后会

逐渐萎缩变小。上述这些腺体的主要作用

是帮助身体对抗感染。

当发生扁桃体炎时,就是扁桃体受到了感 染。一般都由于咽喉及上呼吸道受到细菌感 染而失守。除此之外,慢性扁桃体炎在机体内 外环境发生变化的情况下,容易形成病灶,发 生变态反应,产生各种并发症,如风湿性关节 炎、风湿热、心脏病、肾炎等全身性疾病。

## 急性、慢性扁桃体炎的区别

扁桃体炎分为急性扁桃体炎和慢性扁 桃体炎,下面我们来具体介绍一下:

急性扁桃体炎 急性非特异性炎症,常 继发于上呼吸道感染,是一种很常见的咽部 疾病。好发于儿童及青年,季节更替,气温 变化时容易发病。

主要致病菌:乙型溶血性链球菌,但非 溶血性链球菌、葡萄球菌、肺炎链球菌、流感 杆菌或腺病毒、鼻病毒、单纯性疱疹病毒等 也可引起本病。细菌和病毒混合感染也不 少见。上述病原体存在于正常的口腔及扁 桃体内而不会致病,当某些因素导致全身或 局部抵抗力下降时,病原体侵入人体内,或 原有大量细菌繁殖而致病。受凉,潮湿,疲 劳过度,烟酒过度,有害气体等均可为诱 因。急性扁桃体炎的病原体通过飞沫或直 接接触而传染。

症状表现:全身症状起病急,头痛,畏寒, 高热可达39℃至40℃,尤其是幼儿可因高热 而抽搐、呕吐等。局部症状咽痛明显,疼痛剧 烈时可引起吞咽困难,也可放射至耳部,出现 耳鸣,耳闷听力下降等,儿童若因扁桃体肥大 影响呼吸时,可妨碍其睡眠,夜间常惊醒。

慢性扁桃体炎 多是由于急性扁桃体炎 反复发作或因腭扁桃体引流不畅,窝内细菌 病毒感染而演变成慢性炎症。也可继发于 猩红热、白喉、流感、麻疹、鼻腔及鼻窦感染。

主要致病菌:链球菌和葡萄球菌。

症状表现:反复 急性扁桃体炎发作, 并有咽部不适及堵 塞感。也有部分 患者无明显急性发作 史,表现为经常咽部不适, 异物感,发干,发痒,刺激性咳 嗽,口臭等。扁桃体过度肥大可引起 吞咽困难,说话含糊不清,呼吸不畅或 睡眠时打鼾。脓栓常随吞咽进入消化 道,部分患者可出现消化不良、头痛、四 肢乏力、容易疲劳或低热等表现。

### 五种情况 考虑切除扁桃体

扁桃体到底应该切除还是保留 呢? 当扁桃体反复炎性发作,且严重 影响机体的正常生理功能时,是可以 考虑手术治疗的。出现以下情况时, 可以考虑切除扁桃体:


1. 反复出现急性扁桃体炎发作, 每次感染都会出现发烧、咽痛、咽喉黏膜 充血现象,同时可出现化脓性扁桃体炎, 表现为扁桃体表面出现脓点,每年发作4 至5次以上,连续发作2年。

2. 扁桃体过度肥大, 妨碍吞咽、 呼吸、发声功能,睡觉打呼噜。

3. 扁桃体反复感染导致风湿性 心脏病、心肌炎、关节炎、肾小球肾炎 及皮肤病等,应考虑切除扁桃体。

4. 白喉带菌者,保守治疗无效时。 5. 各种扁桃体良性肿瘤,可连同 扁桃体一并切除。

如何预防慢性扁桃体炎反复发 作呢? 大家可以试试这样做:



- 1.多运动,提高免疫力及抗病能力。
- 2. 多休息,不要让机体过度劳累。
- 3.避免着凉,预防感冒。 4. 多喝水,保持咽喉部的湿润状态。
- 5. 认真刷牙漱口, 给扁桃体营造 良好的口腔环境。

6. 少吃辛辣食物。

(据《北京青年报》)